

Test cutanei allergologici:

Prick test

Cara paziente, caro paziente

Desideriamo fornirle alcuni chiarimenti e indicazioni pratiche prima che si presenti per il test.

Prick test

Il prick test serve a diagnosticare allergie agli allergeni ambientali (pollini, acari domestici, pelo animale, muffe) e a quelli alimentari. Il test consiste nell'applicazione di piccole gocce di estratto allergenico sull'avambraccio, dopodiché l'area di pelle interessata viene leggermente graffiata. In caso di reazione positiva, dopo 10–20 minuti si forma un piccolo pomfo (vescicola).

Prima del prick test va tenuto conto di quanto segue:

- Dal momento che la reazione cutanea può essere soppressa da alcuni medicinali, dopo aver consultato il Suo medico dovrà sospendere l'assunzione dei seguenti medicinali:
 - Antistaminici (Aerius, Atarax, Bilaxten, Claritine, Fenistil, Telfast, Xyzal, Zaditen, Zyrtec) per almeno 3 giorni;
 - Psicofarmaci e rimedi contro la tosse con effetto antistaminico per 5 giorni;
 - Corticosteroidi sistemici in caso di terapia di breve durata per 3 giorni, in caso di terapia di lunga durata per 3 settimane.
- Il giorno del test, non ungere gli avambracci.
- Se concordato con il medico, porti i campioni necessari al test

Inselspital

Clinica universitaria di dermatologia

Laboratorio per i test cutanei

CH-3010 Berna

Tel. +41 31 632 22 80

www.dermatologie.insel.ch

Se non le dovesse essere possibile rispettare l'appuntamento, la preghiamo di disdirlo per tempo, al più tardi 24 ore prima della sessione prevista.

In caso di appuntamento mancato ingiustificatamente, le verranno addebitati CHF 60.–.

Telefono +41 31 632 22 80 o e-mail: derma.hauttest@insel.ch

Clinica universitaria di dermatologia, Laboratorio per i test cutanei, ingresso 14D, Freiburgstrasse 34

